

Ofte stillede spørgsmål fra patienter vedrørende sikkerheden af Arixobat

Her er nogle spørgsmål, som du kan have, når du tager Arixobat.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du har andre spørgsmål og læs indlægssedlen, der følger med din medicin.

1. Hvad er Arixobat?

Arixobat er et oralt receptpligtigt lægemiddel til behandling af voksne, som:

- Pludselig falder i søvn i løbet af dagen og på uventede tidspunkter (narkolepsi).
- Oplever pludselig mathed eller lammede muskler i forbindelse med stærke følelser (katapleksi).

2. Må jeg drikke alkohol, når jeg tager Arixobat?

Nej, du må ikke drikke alkohol, når du tager Arixobat.

Virningen af Arixobat kan forstærkes, og du kan opleve åndedrætsbesvær (respirationsdepression), som kan være dødelig. Du kan også opleve svækket tankegang og forvirring.

3. Hvad er de alvorlige bivirkninger af Arixobat?

Åndedrætsbesvær (respirationsdepression)

Arixobat kan påvirke vejrtrækningen. Kontakt lægen, før du tager Arixobat, hvis du har vejrtræknings- eller lungeproblemer. Du har også øget risiko for respirationsdepression, hvis du er overvægtig. Du bør ikke drikke alkohol, da alkohol kan øge risikoen for respirationsdepression. Respirationsdepression kan være alvorlig og endda dødelig.

Depression og selvmordstanker

Hvis du føler dig deprimeret eller har tanker om at gøre skade på dig selv, mens du tager Arixobat, skal du straks fortælle det til din læge. Du skal også fortælle det til din læge, hvis du tidligere har haft en depression.

Nedsat bevidsthed

Da Arixobat virker direkte på hjernen kan det forårsage dødsghed og nedsætte din bevidsthed. Dette kan føre til koma og kan være dødelig. Det er vigtigt, at du ikke drikker alkohol, mens du tager Arixobat. Tag ikke andre lægemidler, som forårsager dødsghed. Kør ikke bil og betjen ikke maskiner indenfor 6 timer efter indtagelse af Arixobat.

Krampeanfald

Arixobat kan forårsage krampeanfald. Fortæl det til din læge, hvis du tidligere har haft krampeanfald, før du tager Arixobat.

Afhængighed/misbrug/forkert brug

Det aktive stof i Arixobat er gamma-hydroxybutyrat (GHB) eller 4-hydroxybutansyre, natrium salt). GHB er et stof, som er blevet misbrugt og brugt forkert. Din læge vil derfor spørge dig, om du nogensinde har misbrugt nogen form for lægemidler. Misbrug og forkert brug af Arixobat er farlig og kan have dødelig konsekvens.

Disse er ikke alle bivirkninger af Arixobat. Tal med din læge og få medicinsk rådgivning om bivirkninger.

4. Er Arixobat sikkert at tage sammen med anden medicin?

Som med al andre lægemidler er det meget vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du tager andre lægemidler. Dette gælder også lægemidler, som er købt uden recept. Arixobat bør ikke tages sammen med lægemidler, som forårsager dødsghed eller lægemidler, som hæmmer aktiviteten i centralnervesystemet. Sørg for at fortælle lægen, hvis du tager lægemidler, der påvirker centralnervesystemets aktivitet (lægemidler mod depression, valproat, topiramat, phenytoin eller ethosuximid).

Bed sundhedspersonalet om Arixobats Patient informationskortet, som du altid skal have med dig til at minde dig om brugen af Arixobat. Vis dette informationskort til alle dine læger, så de ved, at du tager Arixobat. Dette er særligt vigtigt, hvis de andre læger udskriver andre lægemidler til dig.

5. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ved et uheld tager mere end den ordinerede dosis (overdosis)?

Søg straks akut hjælp, hvis du har taget for meget Arixobat. Symptomerne ved at tage for meget Arixobat kan omfatte ophidselse, forvirring, svækket bevægelighed, svækket vejrtrækning, sløret syn, voldsomme svedeture, hovedpine, opkastning og nedsat bevidsthed, som kan føre til koma og krampeanfald.

Medbring medicinflasken (også selvom den er tom), det vil hjælpe sundhedspersonalet til at behandle dine symptomer.

6. Hvad sker der, hvis jeg pludselig holder op med at tage Arixobat?

Du kan opleve abstinenssymptomer, hvis du pludselig holder op med at tage Arixobat. Du kan opleve, at katapleksianfaldene vender tilbage og du kan opleve søvnløshed, hovedpine, angst, svimmelhed, problemer med at sove, søvnhed, hallucinationer og unormal tankevirksomhed.

7. Er der anden vigtig information, som jeg skal vide om, når jeg tager Arixobat?

- Del aldrig Arixobat med andre.
- Tag kun den dosis, som din læge har ordineret. Tal med din læge, hvis du synes, at din dosis skal ændres.
- Overhold altid et interval på mindst 2-3 timer mellem sidste måltid og indtagelse af Arixobat. Overhold altid den samme doserings-timing i forhold til dine måltider.
- Opbevar altid Arixobat på et sikkert sted i den originale emballage.
- Opbevar Arixobat utilgængeligt for børn.
- Aflever ikke anvendt lægemiddel til apoteket.

- Hvis du oplever usædvanlige symptomer, såsom mærkelige tanker, herunder tanker om at skade andre, selvmordsforsøg, mental forstyrrelse inklusive at se eller høre ting, der ikke er reelle (hallucinationer), usammenhængende tale eller desorienteret og ophidset opførsel, åndedrætsbesvær og kramper under behandling med Arixobat, skal du straks kontakte din læge.