

Checklista inför behandlingsstart

Denna checklista inför behandlingsstart ska säkerställa rätt användning av Arixobat. Vänligen fyll i alla delar av listan, datera det, och arkivera det i patientjournalen.

Läs också produktresumén för fullständig information om Arixobat. För fler checklistor, vänligen kontakta oss på:

Aristo Pharma Nordic, Tonsbakken 16-18, DK-2740 Skovlunde, Danmark
Info.nordic@aristo-pharma.dk

Patientens namn

Kriterier för säker användning

1) Kontrollera att patienten uppfyller kriterierna för den avsedda användningen av Arixobat:

- Diagnosticerad narkolepsi med kataplexi
- Patienten är ≥ 18 år
- Ingen anamnes av egentlig depression eller brist på succinylsemialdehyddehydrogenas
- Ingen aktuell användning av opioider och/eller barbiturater

2) Kontrollera om något av följande kriterier gäller för din patient eftersom de kan påverka säker användning av Arixobat:

- Om patienten är överkänslig mot natriumoxibat
- Intag av alkohol vilket ökar risken för andningsdepression
- Tidigare missbruk av läkemedel (Arixobat har potential att missbrukas och bli beroendeframkallande)
- Ytterligare risk för hypoventilation
- Underliggande respiratorisk sjukdom
- BMI ≥ 40 kg/m²
- Anamnes på depression, psykos och epileptiska anfall (depression/ självmordstankar är en risk vid användning av Arixobat)
- Informera patienten om risk vid användning av Arixobat

3) Granskning av samtidig medicinering (kan behöva justeras):

- Sedativa hypnotika
- Antidepressiva läkemedel
- Ångestdämpande läkemedel som t.ex. benzodiazepiner
- Modafinil
- Läkemedel som ökar aktiviteten i centrala nervsystemet
- Andra läkemedel som valproat, fenytoin, topiramid eller etosuximid

4) Informera din patient om följande och om behovet av att söka läkarvård i dessa fall:

- Betydelsen av avhållsamhet från alkohol och efterlevnad av tidsintervallet mellan sista måltid och intag av Arixobat
- Symptom på hypoventilation
- Symptom på depression, självmordstankar och tankestörningar, inklusive tankar om att skada andra
- Risken för att Arixobat kan provocera epileptiska anfall
- Effekter på centrala nervsystemet och att Arixobat påverkar förmågan att köra bil och använda tunga maskiner

5) Förklaring av villkoren för säker lagring av Arixobat:

- Förvaras utom räckhåll för barn
- Arixobat får inte vidarebefordras eller säljas till andra

6) Informera patienten om följande:

- Korrekt dosering och användning av mätsprutan

7) Tillhandahålla patienten instruktionsmaterialen:

- Patientkort
- FAQ med patientinformation
- Hur man tar Arixobat - patientbroschyr

Uppföljningsbesök

Patient namn

Datum för uppföljningsbesök

Kriterier för säker användning

- Kontrollera att patienten tar Arixobat korrekt/ är motiverat att ta Arixobat enligt ordinationen.
 → Tillräcklighet av doseringen
- Kontrollera förändringar i annan samtidig medicinering som kan orsaka läkemedelsinteraktioner
- Var uppmärksam på tecken på missbruk, felaktig användning eller stöld av Arixobat
- Betona vikten av avhållsamhet från alkohol
- Bedöm om fördelarna med fortsatt behandling med Arixobat fortfarande uppväger riskerna

Uppföljningsbesök

Patient namn

Datum för uppföljningsbesök

Kriterier för säker användning

- Kontrollera att patienten tar Arixobat korrekt/ är motiverat att ta Arixobat enligt ordinationen.
 → Tillräcklighet av doseringen
- Kontrollera förändringar i annan samtidig medicinering som kan orsaka läkemedelsinteraktioner
- Var uppmärksam på tecken på missbruk, felaktig användning eller stöld av Arixobat
- Betona vikten av avhållsamhet från alkohol
- Bedöm om fördelarna med fortsatt behandling med Arixobat fortfarande uppväger riskerna

Uppföljningsbesök

Patient namn

Datum för uppföljningsbesök

Kriterier för säker användning

- Kontrollera att patienten tar Arixobat korrekt/ är motiverat att ta Arixobat enligt ordinationen.
 → Tillräcklighet av doseringen
- Kontrollera förändringar i annan samtidig medicinering som kan orsaka läkemedelsinteraktioner
- Var uppmärksam på tecken på missbruk, felaktig användning eller stöld av Arixobat
- Betona vikten av avhållsamhet från alkohol
- Bedöm om fördelarna med fortsatt behandling med Arixobat fortfarande uppväger riskerna

Uppföljningsbesök

Patient namn

Datum för uppföljningsbesök

Kriterier för säker användning

- Kontrollera att patienten tar Arixobat korrekt/ är motiverat att ta Arixobat enligt ordinationen.
 → Tillräcklighet av doseringen
- Kontrollera förändringar i annan samtidig medicinering som kan orsaka läkemedelsinteraktioner
- Var uppmärksam på tecken på missbruk, felaktig användning eller stöld av Arixobat
- Betona vikten av avhållsamhet från alkohol
- Bedöm om fördelarna med fortsatt behandling med Arixobat fortfarande uppväger riskerna