

Patientinstruktion vedrørende brug af Arixobat

Din æske med Arixobat indeholder en flaske Arixobat oral opløsning, en gradueret målesprøjte, en flaskeadapter, to doseringskopper med børnesikret låg til forberedelse og opbevaring af dine to natlige doser og indlægssedlen.

Læs indlægssedlen for yderligere vigtig information før du tager dine første doser Arixobat. Tag altid Arixobat nøjagtigt efter lægens anvisning.


Kontakt lægen, hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymringer vedrørende Arixobat

! Du skal forberede begge doser før du går i seng. !


- 1) Flaskelåget fjernes ved at trykke det ned, mens det drejes mod uret (mod venstre). Når låget er fjernet, sættes flasken i opret stilling på et bord. Mens flasken holdes i opret stilling, indsættes flaskeadapteren i flaskehalsen. Det er kun nødvendigt at gøre dette første gang flasken åbnes. Derefter kan adapteren efterlades i flasken til efterfølgende brug.
- 2) Sæt derefter spidsen af målesprøjten ind midt i flaskens åbning, og tryk hårdt nedad (**se figur 1**).
- 3) Vend flasken på hovedet. Mens du holder pipetten på plads, skal du trække stemplet forsigtigt ned og trække medicinen til den foreskrevne dosis. flasken og sprøjten holdes med den ene hånd, trækkes den foreskrevne dosis (efter 0,25 g gradueringen på sprøjten) op med den anden hånd ved at trække i stemplet.

BEMÆRK: Der vil ikke strømme lægemiddel ind i sprøjten, medmindre flasken holdes i med bunden opad (**se figur 2**).

Figur 1




Figur 2



- 4) Sæt flasken oprejst. Fjern sprøjten fra flaskens åbning. Tøm lægemidlet fra sprøjten ned i et af de medfølgende doseringsbægre ved at trykke på stemplet (**se figur 3**). Gentag dette for det andet doseringsbæger. Hæld derefter ca. 60 ml vand i hvert doseringsbæger (60 ml er ca. 4 spiseskefulde).
- 5) Sæt de medfølgende låg på doseringsbægrene, og drej hvert låg med uret (mod højre), til det klikker og låser i den børnesikre stilling (**se figur 4**). Skyl sprøjten med vand.
- 6) Lige før du går i seng anbringes den anden dosis i nærheden af sengen. Det kan være nødvendigt at stille vækkeuret, så du er sikker på at vågne, når du skal tage den anden dosis tidligst 2½ time og senest 4 timer efter første dosis. Fjern låget fra det første doseringsbæger ved at trykke den børnesikre låsetap ned og drej låget mod uret (mod venstre). Drik hele den første dosis, mens du sidder i sengen, sæt låget på igen, og læg dig straks ned.
- 7) Når du vågner 2½ til 4 timer senere, fjernes låget fra det andet doseringsbæger. Mens du sidder i sengen, drikkes hele den anden dosis, lige før du lægger dig ned for at sove videre. Sæt låget på igen.

Figur 3



Figur 4



! For yderligere information henvises til indlægssedlen for Arixobat og tal med din læge eller apotekspersonalet. !