

Tjekliste 2: Tjekliste for methylphenidat (MPH) til monitorering af igangværende behandling

Det efterfølgende har til hensigt at støtte dig i monitoreringen af igangværende behandling af de relevante ADHD-patienter, som behandles med et produkt, som indeholder MPH.

Som beskrevet mere detaljeret i produktresuméet skal vækst (gælder kun for børn og unge under 18 år) psykiatrisk og kardiovaskulær status monitoreres regelmæssigt:

- Blodtryk og puls skal registreres ved hver justering af dosis og derefter mindst halvårligt
- Højde, vægt og appetit skal mindst registreres halvårligt således at vækstkurven løbende opdateres (gælder kun for børn og unge under 18 år)
- Udvikling af nyopståede eller forværring af forud eksisterende psykiatriske lidelser skal monitoreres ved hver justering af dosis og derefter mindst halvårligt og ved hvert besøg

Det anbefales, at denne tjekliste bruges sammen med produktresuméet for det specifikke lægemiddel som anvendes.

Download og udskriv denne tjekliste inden patientens besøg. Det vil ikke være muligt at gemme patientspecifikke oplysninger på webstedet. Den udfyldte tjekliste kan anvendes som dokumentation i patientjournalerne.

Efterhånden som du arbejder dig igennem tjeklisten, kan det endvidere være praktisk sammen med patienten eller værgeren og forældre eller værger for børn og unge under 18 år at gennemgå indlægseddelen til det specifikke lægemiddel, der ordineres.

Monitorering under igangværende behandling med MPH

Dato for vurdering:	_____
Årsag til vurdering:	_____
Patientens navn:	_____
Fødselsdato:	_____
Alder:	_____
Køn:	_____

Gennemgå omhyggeligt følgende systemer som indikeret herunder ved hver justering af dosis og ved opfølgingsbesøg mindst halvårligt:

	Evalueret
Generel lægelig vurdering for børn og unge under 18 år	
• Dokumentér højde, vægt og appetit (se særskilt opfølgningsskema) - gælder kun for børn og unge under 18 år	<input type="checkbox"/>
Overvej seponering af MPH, hvis vækst er under det forventede	
Almene medicinske tilstande, alle patienter	
• Dokumentér enhver tegn på misbrug, forkert brug eller ikke-terapeutisk anvendelse af MPH	<input type="checkbox"/>
• Graviditet	<input type="checkbox"/>
Evaluer fordel / risiko	
Nye kardiovaskulære fund, alle patienter	
Blodtryk og puls skal registreres	
• Palpitationer	<input type="checkbox"/>
• Brystsmerte ved belastning	<input type="checkbox"/>
• Uforklaret synkope	<input type="checkbox"/>
• Dyspnø	<input type="checkbox"/>
• Andre symptomer, der tyder på hjertesygdom	<input type="checkbox"/>
Henvi til øjeblikkelig evaluering hos hjertespecialist	
Nye neurologiske fund, alle patienter	
• Alvorlig hovedpine, følelsesløshed, svaghed eller lammelse, nedsættelse af koordinationsevne, syn, tale, sprog eller hukommelse	<input type="checkbox"/>
Ovenstående tilstande kan tyde på cerebral vaskulitis: afbryd MPH behandlingen	
• Stigning i hyppigheden af anfald eller helt nye anfald	<input type="checkbox"/>
MPH bør seponeres	

	Evalueret
Nye psykiatriske fund eller forværring af eksisterende psykiatriske symptomer, alle patienter	Udvikling af nyopståede eller forværring af forud eksisterende psykiatriske lidelser skal monitoreres
• Psykotiske eller maniske symptomer	<input type="checkbox"/>
Overvej seponering af MPH	
• Selvmordsforestillinger eller -adfærd	<input type="checkbox"/>
Overvej behandling af underliggende psykiatrisk tilstand	
Evaluer fordel/risiko igen	
Overvej seponering af MPH	
• Aggressiv og fjendtlig adfærd	<input type="checkbox"/>
Overvej behovet for justering af behandling	
• Angst, agitation eller anspændthed	<input type="checkbox"/>
• Depressive symptomer	<input type="checkbox"/>
• Motoriske eller verbale tics eller forværring deraf	<input type="checkbox"/>
Behandlingens varighed, alle patienter	
• Patienten behandles kontinuerligt i >12 måneder	<input type="checkbox"/>
• Bedring i symptomer efter fornøden justering af dosis over en periode på 1 måned observeres, ellers anbefales seponering af lægemiddel	<input type="checkbox"/>
Overvej prøveperiode uden medicin mindst én gang om året for at fastlægge, om fortsat behandling stadig er nødvendig	

Registrer yderligere oplysninger her

Efter evalueringen herover bruges det medfølgende skema til at registrere de oplysninger, der kræves til løbende monitorering: ([link til skema](#))

Slut på behandling

Der kræves omhyggelig overvågning ved seponering, eftersom det kan afsløre

- **Depression** såvel som
- **Kronisk hyperaktivitet**

Nogle patienter kan have brug for langvarig opfølgning.